



## Nilocin 3-i-1 Ligtorne Behandling

DK

Føtsede

Læs denne indlægsseddel omhyggeligt før brug.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling bruges til behandling af ligtorne. Brug og håndter dette produkt forsigtigt for at opnå de bedste resultater.

### HVAD ER EN LIGTORN?

Ligtorne er små områder af fortrykket hud. De dannes oftest som reaktion på tryk eller gnidning ved knogleområder. Huden fortrykkes i et forsøg på at beskytte de underliggende strukturer. Ligtorne er smertefulde, når de udsættes for tryk. Midten af ligtornerne er ofte mørkere og har form som en torn. Når dette område udsættes for pres, kan ligtornerne være meget smertefulde. Ligtorne kan dukke op hvor som helst på foden, og kan være mere eller mindre smertefuldt. Ligtorne kan også udvikle sig mellem tærerne, når to led gnides mod hinanden. Seed corns er anderledes, end de traditionelle ligtorne, de optræder normalt i små grupper på fodsålen og føles som en lille splint af glas. Seed corns skyldes oftest mangel på hydrering.

### NILOCIN® 3-I-1 LIGTORNEBEHANDLING

Nilocin® 3-i-1 ligtornebehandling inkluderer:

- En pen med 3 ml opløsning (myresyre, ethyl lactate)
- Hydrokolloid plastre 7
- Denne indlægsseddel.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling er specifikt udviklet til behandling af ligtorne på fødder og hænder. Må ikke påføres andre dele af kroppen, såsom ansigt eller kønsorganer.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling absorberes øjeblikkeligt og spredes lokalt i ligtornerne. Behandlingen virker ved at blødgøre, nedbrude og hydrere ligtornerne. Plastret forbedrer hydreringen og lindrer smerter.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling kan bruges som behandling til børn fra 4 år og opefter.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling kan benyttes af gravide og ammende kvinder.

### FORHOLDSREGLER

Kun til udvortes brug. Opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel. Håndter produktet med forsigtighed under hensyntagen til instruktionerne. Diabetikere bør konsultere deres læge inden brug.

- Brug ikke Nilocin® 3-i-1 Ligtorne Behandling, hvis du er allergisk over for indholdsstofferne samt overfor bistik eller myrebid.
- Undgå kontakt med den sunde hud omkring ligtornerne ved påføring.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres ved tynd og følsom hud og ved behandling af børn. Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, hvis I tvivl.
- Påfør ikke Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling på øm eller blødende, irriteret, betændt eller blæret hud.
- Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer. Kontakt din læge, hvis det behandlede område bliver rødt, smertefuldt eller betændt.



• Må ikke anvendes i kombination med andre ligtornebehandlinger.

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I KONTAKT MED ØJNENE ELLER SLIMHINDER, SKYL MED RIGELIGT VAND I 15 MINUTTER OG KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.

### SÅDAN BRUGES NILOCIN® 3-I-1 LIGTORNEBEHANDLING

Vask og tør området der skal behandles. Anvend Nilocin® 3-i-1 Ligtorne Behandling:

- Fjern hæften fra pennen.
- Ligtornerne masseres forsigtigt med spidsen af applikator pennen. Hele overfladen af ligtornerne skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud.
- Påsæt et hydrokolloid plaster over det behandlede område. Vær omhyggelig med at sikre at plasteret klæber til huden.
- Gentag denne procedure hver anden dag i 14 dage. Hvis du føler ubehag, når du påfører væsken, kan hudens overflade neutraliseres med vand.



Bemærk venligst, at spidsen af pennen kan se tør ud, da kun en lille mængde væske er nødvendig for at være effektiv.

Hvis du er i tvivl om spidsen af pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir for at checke, at der kommer et vådt mærke.

### BIVIRKNINGER

Det er vigtigt at anvende produktet som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, da dette kan forårsage en mild midlertidig ulceration, midlertidig forbrænding, midlertidig smerte eller midlertidig hyper- eller hypopigmentering.


Alvorlige hændelser skal indberettes til producenten og relevant myndighed.

### OPBEVARING

Opbevar produktet ved 2-25°C, væk fra direkte sollys. I den originale emballage og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Hæften påsættes omhyggeligt efter brug - tryk indtil der høres et klik.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark.  
Nilocin® er et registreret varemærke tilhørende Unigroup ApS.

CE 0425



**TEKNISKE DATA – Produktnavn:** Nilocin®. **Produkt:** Nilocin® anvendes til behandling af ligtorne. **Ingredienser (INCI):** Formic acid (60%), Ethyl lactate. **Plastre:** 7 hydrocolloid plastre. CE0197 Zhejiang Top-medical Medical Dressing Co., Ltd., No.633, 2 Jinhai Road, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China. Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, 2595RA, The Hague, Netherlands. **Indhold (pen):** 3 ml, tilstrækkeligt til minimum 200 påføringer. **Registrering:** Nilocin® er klassificeret og registreret som Medicinsk udstyr Klasse IIa. **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25°C i den originale emballage og uden for direkte sollys sammen med denne indlægsseddel, og udenfor synsfelt og rækkevidde for børn. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark. [www.nilocin.com](http://www.nilocin.com)

UG202302-101021



## Nilocin 3-i-1 Ligtorne Behandling

DK

Føtsede

Læs denne indlægsseddel omhyggeligt før brug.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling bruges til behandling af ligtorne. Brug og håndter dette produkt forsigtigt for at opnå de bedste resultater.

### HVAD ER EN LIGTORN?

Ligtorne er små områder af fortrykket hud. De dannes oftest som reaktion på tryk eller gnidning ved knogleområder. Huden fortrykkes i et forsøg på at beskytte de underliggende strukturer. Ligtorne er smertefulde, når de udsættes for tryk. Midten af ligtornerne er ofte mørkere og har form som en torn. Når dette område udsættes for pres, kan ligtornerne være meget smertefulde. Ligtorne kan dukke op hvor som helst på foden, og kan være mere eller mindre smertefuldt. Ligtorne kan også udvikle sig mellem tærerne, når to led gnides mod hinanden. Seed corns er anderledes, end de traditionelle ligtorne, de optræder normalt i små grupper på fodsålen og føles som en lille splint af glas. Seed corns skyldes oftest mangel på hydrering.

### NILOCIN® 3-I-1 LIGTORNEBEHANDLING

Nilocin® 3-i-1 ligtornebehandling inkluderer:

- En pen med 3 ml opløsning (myresyre, ethyl lactate)
- Hydrokolloid plastre 7
- Denne indlægsseddel.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling er specifikt udviklet til behandling af ligtorne på fødder og hænder. Må ikke påføres andre dele af kroppen, såsom ansigt eller kønsorganer.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling absorberes øjeblikkeligt og spredes lokalt i ligtornerne. Behandlingen virker ved at blødgøre, nedbrude og hydrere ligtornerne. Plastret forbedrer hydreringen og lindrer smerter.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling kan bruges som behandling til børn fra 4 år og opefter.

Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling kan benyttes af gravide og ammende kvinder.

### FORHOLDSREGLER

Kun til udvortes brug. Opbevares ude af syne og utilgængeligt for børn. Produktet indeholder et ætsende middel. Håndter produktet med forsigtighed under hensyntagen til instruktionerne. Diabetikere bør konsultere deres læge inden brug.

- Brug ikke Nilocin® 3-i-1 Ligtorne Behandling, hvis du er allergisk over for indholdsstofferne samt overfor bistik eller myrebid.
- Undgå kontakt med den sunde hud omkring ligtornerne ved påføring.
- Ekstra forsigtighed bør udvises, når behandlingen påføres ved tynd og følsom hud og ved behandling af børn. Det er bedre at påføre for lidt væske end for meget, hvis I tvivl.
- Påfør ikke Nilocin® 3-i-1 Ligtornebehandling på øm eller blødende, irriteret, betændt eller blæret hud.
- Overskrid ikke antallet af anbefalede applikationer. Kontakt din læge, hvis det behandlede område bliver rødt, smertefuldt eller betændt.



• Må ikke anvendes i kombination med andre ligtornebehandlinger.

HVIS PRODUKTET VED ET UHELD KOMMER I KONTAKT MED ØJNENE ELLER SLIMHINDER, SKYL MED RIGELIGT VAND I 15 MINUTTER OG KONTAKT LÆGE ELLER SKADESTUE.

### SÅDAN BRUGES NILOCIN® 3-I-1 LIGTORNEBEHANDLING

Vask og tør området der skal behandles. Anvend Nilocin® 3-i-1 Ligtorne Behandling:

- Fjern hæften fra pennen.
- Ligtornerne masseres forsigtigt med spidsen af applikator pennen. Hele overfladen af ligtornerne skal behandles. Undgå kontakt med den sunde omgivende hud.
- Påsæt et hydrokolloid plaster over det behandlede område. Vær omhyggelig med at sikre at plasteret klæber til huden.
- Gentag denne procedure hver anden dag i 14 dage. Hvis du føler ubehag, når du påfører væsken, kan hudens overflade neutraliseres med vand.



Bemærk venligst, at spidsen af pennen kan se tør ud, da kun en lille mængde væske er nødvendig for at være effektiv.

Hvis du er i tvivl om spidsen af pennen er tør, presses tippen let mod absorberende papir for at checke, at der kommer et vådt mærke.

### BIVIRKNINGER

Det er vigtigt at anvende produktet som foreskrevet. Antallet af applikationer må ikke overskrides, da dette kan forårsage en mild midlertidig ulceration, midlertidig forbrænding, midlertidig smerte eller midlertidig hyper- eller hypopigmentering.


Alvorlige hændelser skal indberettes til producenten og relevant myndighed.

### OPBEVARING

Opbevar produktet ved 2-25°C, væk fra direkte sollys. I den originale emballage og udenfor børns synsfelt og rækkevidde. Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Hæften påsættes omhyggeligt efter brug - tryk indtil der høres et klik.

Unigroup ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark.  
Nilocin® er et registreret varemærke tilhørende Unigroup ApS.

CE 0425



**TEKNISKE DATA – Produktnavn:** Nilocin®. **Produkt:** Nilocin® anvendes til behandling af ligtorne. **Ingredienser (INCI):** Formic acid (60%), Ethyl lactate. **Plastre:** 7 hydrocolloid plastre. CE0197 Zhejiang Top-medical Medical Dressing Co., Ltd., No.633, 2 Jinhai Road, Economic and Technological Development Zone, Wenzhou, 325025 Zhejiang, P.R. China. Lotus NL B.V., Koningin Julianaplein 10, 2595RA, The Hague, Netherlands. **Indhold (pen):** 3 ml, tilstrækkeligt til minimum 200 påføringer. **Registrering:** Nilocin® er klassificeret og registreret som Medicinsk udstyr Klasse IIa. **Opbevaring:** Opbevares ved 2-25°C i den originale emballage og uden for direkte sollys sammen med denne indlægsseddel, og udenfor synsfelt og rækkevidde for børn. Må ikke bruges efter udløbsdatoen. **Producent:** Unigroup ApS, Diplomvej 373, 2800 Lyngby, Danmark. [www.nilocin.com](http://www.nilocin.com)

UG202302-101021